

Beheerrichtlijn Vochtig weidevogelgrasland (N13.01)

Vochtig weidevogelgrasland omvat natte en vochtige graslanden met primair een weidevogeldoelstelling; ze zijn van belang voor een diversiteit in soorten. Een goede kwaliteit kenmerkt zich door een mozaïek van verschillende beheervormen van grasland (diversiteit in maaidata, beweiding, plasdras etc.). Verder zijn van belang: rijke en bereikbare bodemfauna, insectenrijkdom ('kuikengrasland'), een open landschap met weinig dekking voor predatoren en brede, rijkbegroeide slootkanten. Heel laat gemaaide delen (na 1 augustus) zijn waardevol voor de kwartelkoning, andere vogelsoorten en insecten. Het maai- en graasbeheer wordt zo uitgevoerd dat zo min mogelijk jongen daar last van krijgen. De graslanden worden bemest met organische mest om het aanbod van voedsel voor weidevogels te behouden of vergroten.

Instandhoudingsbeheer

- Maaien (met nestbescherming) na 15 juni en in september/oktober of nabeweiden vanaf de zomer, afhankelijk van de aanwezige soorten.
- Extensieve voorbeweiding, zodat een latere maaidatum mogelijk is. Bij beweiding maximaal 2-2,5 GVE/ha.
- Alleen bemesten met ruige stalmest. De organische stof in ruige mest is voer voor rode regenwormen en zorgt voor een goede structuur van de bovenste laag van het maaiveld. De bemestingsdruk mag echter niet te hoog zijn. Aanbevolen wordt een bemesting van maximaal 5-10 ton/jaar/hectare waarbij de natste delen niet bemest worden.



Foto: Andreas Trepte



Foto: Walter Siegmund

Kwaliteit verhogend beheer op standplaatsniveau

- Vernatten, t.b.v. late gewasproductie en permeabiliteit grond.
- Maken van plas-drassituaties, bijvoorbeeld door gedeeltelijk afgraven van oevers.
- Op wisselende plekken 5-10% van de oppervlakte per keer niet maaien. Houd bij maaien rekening met de uitvliegperiode van kuikens, afhankelijk van het weer. Maai van binnen naar buiten. Zorg voor afwisseling van tijdstip en vorm van beheer.
- Openheid van het landschap bewaren.

Kwaliteitsimpuls op landschapsniveau

- Optimaliseren van de hydrologische situatie (voorkomen van ontwatering, herstel van lokale kwelstromen, zorgen voor een goede waterkwaliteit).
- Afstemmen van weidevogelvriendelijk beheer met de omgeving, zodat een groot aaneengesloten gebied ontstaat dat geschikt is voor weidevogels.

Signalen voor achteruitgang van de kwaliteit van het beheertype

- Afname van het aantal broedparen.
- Toename van soorten als akkerdistel, ridderzuring en pitrus.

Waar zitten de kosten in

- Bewerken/inrichten van het terrein.
- Maaien en afvoeren.
- Verwijderen van ongewenste vegetatie.
- Onderhouden/vervangen van rasters.
- Onderhouden/vervangen van bruggen/duikers/dammen/stuwen/putten.
- Onderhouden van watergangen.