



Beheerrichtlijn Veenmosrietland en moerasheide (N06.01)

Goed ontwikkeld veenmosrietland wordt gekenmerkt door een ijle rietvegetatie met een kruid- en veenmoslaag. Goed ontwikkelde moerasheide heeft verspreid groeiende dwergstruiken boven een veenmoslaag.

Hoe houdt u dit type in stand?

- Maai de vegetatie en voer het maaisel af. Het is belangrijk dat u kwetsbare jonge verlandingsvegetaties ontziet.
- Handhaaf hoge grondwaterstanden met weinig fluctuaties die maximaal enkele tientallen centimeters (20-40 cm) mogen wegzakken in de zomer.
- Houd uw terrein vrij van de opslag van bomen en struiken (maximaal 10%).

Hoe kunt u de kwaliteit verhogen?

- Herstel het natuurlijk dynamisch peilbeheer, met hoge waterstanden in de winter en iets lagere waterstanden in de zomer. Het is echter ongewenst om de waterstanden te verlagen voor een lager zomerpeil; een hoger winterpeil met het water boven maaiveld heeft de voorkeur.
- Maak handmatig kleine plagstroken. Plaggen heeft echter een kortdurend effect omdat de vegetatie zich weer vrij snel ontwikkelt. Om plagstroken effectief te maken zou u ze moeten combineren met hydrologische maatregelen.
- U kunt successie vertragen door schoon (arm aan voedingsstoffen!) en baserijk water in het perceel te laten stromen, bijvoorbeeld door middel van kleine greppeltjes.
- Wissel af in maaibeheer voor extra variatie. U kunt bepaalde delen 's zomers maaien voor botanisch beheer en andere delen 's winters voor rietvogels. Door 's zomers te maaien worden meer voedingsstoffen afgevoerd en wordt de vegetatie (met name riet) opener van structuur.



Signalen van een goede/slechte kwaliteit

- + Er is een natuurlijke verschuiving in soorten. Een uitgangssituatie met basenrijk water in de wortelzone verschuift na verloop van tijd naar een regenwater gedomineerd systeem met veenmossen en dwergstruiken.
- Er treedt verruiging en verbossing op met bijvoorbeeld pijpenstrootje en wilgen of elzen. Verdroging is de oorzaak, maaien vertraagt dit proces.
- Er ontstaat vermesting en verruiging door inlaat van gebiedsvreemd water.
- Er ontwikkelt een vegetatie met exoten zoals cranberry of appelbes of een dominantie van riet en moerassoorten.

Kostenposten

- Maaien en het maaisel oprapen en afvoeren.
- Onderhouden/vervangen van bruggen/duikers/dammen/stuwen/putten voor de gewenste waterstanden.



Deze beheerrichtlijn is onderdeel van het Kwaliteitshandboek SNL-certificering van de Unie van Bosgroepen. Voor vragen over subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) kunt u contact opnemen met de Unie van Bosgroepen. Voor specifiek advies over het beheer van uw terrein kunt u contact opnemen met de Bosgroep in uw regio. Zie ook de Algemene introductie op de Beheerrichtlijnen.

Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming vooraf door de auteur.
Tekst en beeld: Bosgroepen, 2018 | www.bosgroepen.nl | 0318- 672628